

آموزش به بیماران بلفاروپلاستی در زمان ترخیص

پزشک معالج	بخش: اتاق: تحت:	نام: تاریخ تولد:	نام خانوادگی: نام پدر:
تاریخ پذیرش			

آموزش های زمان ترخیص توسط پزشک و پرستار

نحوه مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف			نام دارو	۱۹۷۵۶
	شب	ظهر	صبح		
قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					
قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					
قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					
رژیم معمولی و باید کم نمک و میوه و سبزیجات تازه همراه با مایعات فراوان استفاده کنند. سایر.....					رژیم غذایی
بلافاصله پس از عمل تا ۴۸ ساعت بعد از جراحی زیبایی پلک ، از کمپرس سرد بصورت متناوب استفاده کنید تا زمانی که محل برش با پانسمان و چسب پوشیده شده نیازی به استفاده از پماد آنتی بیوتیک نیست. بعد از برداشتن پانسمان طبق دستور پزشک ، از پماد آنتی بیوتیک موضعی تا زمان کشیدن بخیه ها در نواحی برش استفاده می شود سایر.....					مراقبت از زخم
محدودیت حرکتی خاصی ندارید و هرچه زودتر می توانید به زندگی عادی خود برگردید در روزهای اول در زمان استراحت بهتر است نیمه نشسته واژ دو عدد بالشت درزیز سر استفاده گردد و از مطالعه طولانی و پایین نگه داشتن سر به مدت طولانی خودداری شود سایر.....					وضعیت حرکتی (میزان فعالیت)
بعد از برداشتن پانسمان جراحی					زمان استحمام



تاریخ و روز مراجعة بعدی : روز پس از ترخیص به پزشک معالج مراجعه شود.(شماره تماس و نحوه برقراری ارتباط با پزشک معالج:

تلفن تماس بیمارستان : ۰۵۱-۳۷۰۴۸۳۲۳ - ۰۵۱-۳۷۰۴۸۲۴۴

۰۵۱-

کلینیک پرستاری آموزش سلامت : روزهای زوج هفته ساعت ۱۰ تا ۱۲ تلفن: ۰۵۱-۳۷۰۴۸۱۲۷

* در صورت نیاز به خدمات پرستاری در منزل نظیر تزریقات، سرم تراپی پانسمان انواع زخم، کشیدن بخیه، کنترل علایم حیاتی به طور شبانه روزی می توانید با نزدیک ترین مراکز مشاوره پرستاری تماس بگیرید.

پیگیری پس از ترخیص آزمایشات ، رادیوگرافی و پاتولوژی (نمونه برداری) : تلفن آزمایشگاه: ۰۵۱-۳۷۰۴۸۱۳۰

** علائم هشدار دهنده: ترشح از محل برش یا قرمزی و تب بالای ۳۸ درجه یا علایم عفونت

تا دو هفته پس از عمل زیبایی پلک از به کار بردن مواد آرایشی بر روی محلهای عمل خودداری نمایید.

چگونه می توان از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ پیشگیری کرد؟

به خاطر داشته باشید اصل مهم در پیشگیری از ابتلا به کووید ۱۹، استفاده صحیح از ماسک و پوشاندن کامل دهان و بینی ، فاصله گذاری اجتماعی (عدم حضور در مکان های شلوغ) و رعایت بهداشت دست و برقراری تهویه مناسب است پس بکوشیم با رعایت این موارد به سلامت خود، خانواده و اجتماع کمک کنیم

<input type="checkbox"/> بیمار	<input type="checkbox"/> چهره به چهره	<input type="checkbox"/> آموزشی CD	<input type="checkbox"/> پمفت
<input type="checkbox"/> همراه بیمار	<input type="checkbox"/> نام و نام خانوادگی :	<input type="checkbox"/> نسبت با بیمار	<input type="checkbox"/> سن

امضاء / اثر انگشت بیمار / همراه:

مهر و امضاء پرستار آموزش دهنده :

مهر و امضاء پزشک معالج :

فرد آموزش گیرنده