


انواژیناسیون

(درهم فرورفتگی روده ها)



واحد آموزشی بیمارستان مادر

گروه هدف: والدین و همراهیان

کد سند: MH\AM\PT\042

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

کد سند: ۰۰۵

آدرس: بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی ۱

شماره تماس: ۳۷۰۴۸۰۰۰ - ۰۵۱

توصیه های پس از ترخیص:

دو روز بعد از عمل جراحی می توانید کودک خود به حمام ببرید.

از کادر درمان جهت سطح فعالیت فرزندتان پس از ترخیص سوال کنید.

به علائم بازگشت انواژیناسیون توجه داشته باشید.

منبع: www.nursingcosult.com

www.uptodate.com



از طریق اسکن این QR CODE ویا سایت زیر می توانید به محتوی این پمفلت و سایر مطالب آموزشی دسترسی داشته باشید.

<https://motherhospital.ir/educational-pamphlet/>

درمان:

هدف اصلی درمان جلوگیری از پاره شدن و عفونت کامل شکم می باشد.

درمان در بیمارستان انجام می شود و شامل:

- برقراری ورید محیطی
- انجام باریم انما جهت شست و شوی روده ها و انجام عکس و سونوگرافی
- انجان باریم هوا: یعنی فرستادن هوا با فشار به درون روده جهت باز شدن درهم رفتگی روده ها
- ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد در صورتی که عفونت شکم داشته باشد یا درمان انما کارساز نباشد، قسمتی از روده از بین رفته باشد و نیاز به خارج سازی آن باشد یا انواژیناسیون بعد از انما نیز دوباره ایجاد شود.
- کودک بعد از درمان باید چند روز در بیمارستان بماند تا از بازگشت نکردن آن اطمینان پیدا کنیم و حرکات روده و رژیم غذایی نرمال داشته باشد.

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شمامست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید

تعریف:

انواژیناسیون یک انسداد نسبی در روده می باشد. زمانی که یک قسمت از روده وارد بخش دیگر آن می شود.

علائم:

- شکم بزرگ شده و سفت
- استفراغ
- بی قراری یا خواب آلودگی
- مدفوع خونی
- تب
- گریه




• شیر نخوردن

• زانو های خود را به قفسه سینه فشار می آورد.

• پوست رنگ پریده

• تعریق



عوامل افزایش ریسک ابتلا:

- پسر بچه ها
- کودکان کمتر از ۳ سال
- کودکان با عفونت های ویروسی
- کودکانی با تومور یا کیست یا پولیپ ،رگه های خونی بدشکل
- کودکانی که اخیرا عمل جراحی شکم انجام دادند.
- ممکن است بعد از دریافت واکسن روتا ویروس هم دیده شود.

عوامل:

در بیشتر مواقع دلیل آن التهاب و تورم غدد لنفی است . اما گاهی ممکن است آپاندیس یا تومور های روده باعث ایجاد آن شوند.

انواژیناسیون عمده ترین علت انسداد روده در کودکان ۳ ماهه تا ۳ ساله می باشد. اما بیشتر در ۱ سالگی رخ می دهد. میزان بروز آن در پسرها بیشتر از دختر ها می باشد.هم در کودکان و هم در بزرگسالان رخ می دهد.

تشخیص:

براساس علائم کودک و معاینه و همچنین استفاده از سونوگرافی یا عکس شکم

