

ختنه



واحد آموزش بیمارستان مادر

گروه هدف: والدین و همراهیان

کد سند: MH\AM\PT\055

تاریخ تنظیم: ۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

کد سند: ۰۰۵

آدرس: بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی ۱

شماره تماس: ۳۷۰۴۸۰۰۰-۵۱

زمان انجام:

معمولا بهتر است در ابتدای تولد قبل از ترخیص از بیمارستان انجام شود.

اما برخی از والدین تحمل این عمل برای نوزاد را ندارند و تصمیم می‌گیرند به تعویق بیندازند این مورد بستگی به فرهنگ و تصمیم آن‌ها دارد. قبل از سه ماهگی معمولا با بی‌حسی موضعی اما بعد از آن با بیهوشی عمومی انجام می‌شود.

منبع: www.nursingconsult.com:

www.uptodate.com



از طریق اسکن این QR CODE و یا سایت زیر می‌توانید به محتوی این پمفلت و سایر مطالب آموزشی دسترسی داشته باشید.

<https://motherhospital.ir/educational-pamphlet/>

جهت کاهش درد عوامل زیر موثرند:

- حضور پدر مادر و آرام کردن کودک
 - محلول‌های قندی
 - دادن استامینوفن
- پزشک قبل از انجام ختنه باید توضیحات کامل را در اختیار پدر و مادر بگذارد.
- چندین عامل باعث به تاخیر انداختن ختنه می‌شود شامل:

- نوزاد نارس
 - نقص در سیستم تناسلی و نیاز به مشورت با جراح یا اورولوژیست کودکان
 - سابقه ی خانوادگی اختلالات خونریزی دهنده
- مراقبت‌های بعد از عمل:

- ۱- پانسمان ناحیه تا ۳-۵ روز باقی بماند زیرا باعث می‌شود که زخم با پوشک در تماس نباشد و تمیز بماند
- ۲- ترشح زرد رنگی چند روز روی ناحیه برش ممکن است دیده شود.
- ۳- در صورت خونریزی، تورم، قرمزی وسیع باید به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- ۴- بعد از ختنه نیاز به هیچ‌گونه درمان اضافی و پماد‌های مختلف نیست.

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید

تعریف:

ختنه در پسران یعنی برداشتن پوست کلاهِک آلت تناسلی و از دوران قدیم رایج شده است. ابتدا در مصر باستان انجام می شد. و بعد ها در بین مسلمانان و یهودیان

ختنه به دو صورت عمل جراحی و سرپایی انجام می شود. اطلاعات دقیقی از این کدام بیشتر انجام می شود یا کدام نوع بهتر است وجود ندارد.



در هنگام تولد این پوست اضافه یک قسمت جدا که چسبیده روی آلت می باشد که و جدا شدگی کامل این قسمت در سنین مختلف ایجاد می شود. که در پسرانی که ختنه نشده اند فضایی را جهت تجمع آلودگی ایجاد می کند.

برخی از والدین ممکن است از ختنه کردن کودکانشان ترس داشته باشند. در این صورت باید تا زمان ختنه بهداشت آن ناحیه رعایت شود.

اثرات سودمند ختنه:

۱- کاهش عفونت مجرای ادراری

۲- کاهش بروز سرطان

۳- کمتر شدن بروز التهاب و سایر مشکلات در ناحیه

تناسلی


۴- بهداشت مناسب ناحیه تناسلی

اما برای موارد فوق فقط ختنه کردن کافی نیست و الزما ختنه باعث بهبود تمام موارد نمی شود.

اثرات نا مطلوب در صورت انجام ختنه

توسط افراد ناوارد:

- برداشتن میزان ناکافی پوست که منجر به ظاهر نامناسب می شود.
- خونریزی
- عفونت در صورت خیف بودن با آنتی بیوتیک درمان می شود.
- منجر به بریدن قسمت پنیس(آلت) می شود
- منجر به ایجاد چسبندگی یا کیست می شود.
- یا اثر زخم روی آلت باقی می ماند.
- در صورت جراحی عوارض بیهوشی نیز محتمل است.



مطالعاتی نشان می دهد که نوزادان در طول ختنه چه علائمی مبنی بر درد را دارند. گریه، افزایش ضربان قلب و کاهش فشار خون از این علائم هستند.