


شکاف کام و لب



واحد آموزش بیمارستان مادر
گروه هدف: والدین و همراهیان

کد سند: MH\AM\PT\054
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
کد سند: ۰۰۵

آدرس: بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی ۱
شماره تماس: ۳۷۰۴۸۰۰۰ - ۰۵۱

- در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه شود:
- در صورت باز شدن و یا خارج شدن بخیه
 - قرمزی و خروج ترشح از محل بخیه ها
 - خونریزی از محل بخیه، دهان و یا بینی
 - اگر کودک تب دارد و درجه حرارت وی بیشتر از ۳۸/۵ درجه است.
 - در صورتی که تب کودک ۲-۳ روز طول بکشد.

منبع: www.nursingconsult.com
www.uptodate.com



از طریق اسکن این QR CODE و یا سایت زیر می
توانید به محتوی این پمفلت و سایر مطالب آموزشی
دسترسی داشته باشید.
<https://motherhospital.ir/educational-pamphlet/>

مراقبت های بعد از عمل در شکاف لب:

- در صورت نداشتن مشکل ۱ روز بعد از عمل کودک مرخص می باشد.
- زخم محل عمل باید کاملاً تمیز نگه داشته شود و به مدت ۳-۴ هفته هیچ گونه ضربه و فشاری به آن وارد نشود.
- اسباب بازی های سفت را از دسترس کودک خارج کنید.
- پانسمان ناحیه عمل، ۲۴ ساعت بعد عمل برداشته می شود و محل بخیه ها با شامپو بچه شستشو داده شده و سپس پماد جنتامایسین چشمی روی آن مالیده شود.



- در زمان تغذیه کودک در وضعیت نشسته باشد و از فنجان و یا قاشق برای نوشیدنی ها استفاده شود.
- معمولاً توصیه می شود که ۷-۱۰ روز بعد عمل جهت کنترل محل عمل به درمانگاه جراحی مراجعه شود.

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شمامست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید

تعریف:

شکاف کام و لب هردو از نقایص هنگام تولد هستند که معمولاً با جراحی قابل درمان می باشد.

شکاف لب: باز شدگی لب فوقانی و بینی

شکاف کام: باز شدن سقف دهان

ممکن است کودک هردوی این نقایص یا یکی از آنها را داشته باشد.

شکاف کام در دختران شایع تر است.

علائم: در دوران بارداری با سونوگرافی مشخص می شود.

و بدو تولد قابل مشاهده است. و ممکن است روی دندان ها، تغذیه، شنوایی یا صحبت کردن کودک اثر داشته باشد.

عوامل:

در دوران بارداری بخصوص سه ماه اول ایجاد می شود.

شکاف کام و لب ممکن است هر کدام به تنهایی بروز کند یا این که نشانه ای از یک سندروم و نقص ژنتیکی باشند.

عوامل آن معمولاً ناشناخته می باشد. اما فاکتور های محیطی و

ژنتیکی اثر دارند.

مصرف سیگار و قلیان ، الکل

بیماری های مادر مثل دیابت

درمان: جراحی می باشد.

• زمان عمل شکاف لب ۳ ماهگی تا ۶ ماهگی و شکاف کام بعد از ۹ ماهگی است.

• در طول زندگی ممکن است کودک به گفتار درمانی ، دندانپزشکی ، مشاوره یا در صورت عفونت گوش به متخصص نیاز داشته باشد.

مراقبت های قبل عمل در شکاف کام:

• پستانک های عادی برای این کودکان قابل استفاده نیست زیرا که قادر به تولید مکش نمی باشد، لذا باید تغذیه آنها توسط سر پستانک های خاص یا سایر وسایل انجام گیرد.

• از آنجایی که این کودکان در تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک دچار مشکل هستند بنابراین برای تغذیه از وسایلی مانند سرشیشه های با سوراخ بزرگ یا سرشیشه های نرم استفاده کنید.


• شیر خوار ۴ ساعت قبل از عمل نباید چیزی بخورد البته ممکن است بسته به نظر پزشک این زمان طولانی تر گردد.



مراقبت های بعد عمل در شکاف کام:

- بعد از عمل کودک را بر روی شکم بخوابانید به طوری که سر وی به یک طرف باشد.
- برای تغذیه کودک پس از عمل باید از فنجان یا سرنگ استفاده گردد. از عمل مکیدن توسط کودک تا ۲ هفته خودداری شود.
- هیچ چیزی را وارد دهان کودک نکنید زیرا باعث صدمه به ناحیه عمل می شود.
- تا ۲ هفته بعد از عمل مایعات صاف شده مانند شیر، سوپ صاف شده و آب به کودک داده شود.
- بعد از هرنوبت تغذیه، دهان کودک با آب کاملاً شسته شود تا باقی مانده ذرات غذایی باعث عفونت و باز شدن بخیه نگردد.
- مراقب باشید کودک به صورت نخوابد

جراحی ترمیم شکاف کام



شکاف لب:

مراقبت های قبل عمل در شکاف لب:

لازم کودک چند ساعت قبل از عمل ناشتا باشد.