




بیمارستان و زایشگاه مادر  
Mother Hospital

## بیمارستان و زایشگاه مادر

### مراقبتهای پس از زایمان



### بیمارستان و زایشگاه مادر

#### واحد آموزش

کد سند: MH\AM\PT\001

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

کد بازنگری: ۰۰۶



آدرس: بلوار سجاد - بزرگمهر شمالی ۱

بندهای مناسب با سایز نرمال استفاده شود

### توصیه های مهم:

☆ بعد از زایمان طبیعی و سزارین به تخلیه مثانه هر دو ساعت یکبار دقت شود به دلیل اینکه ممکن است مثانه حس پر بودن را از دست داده یا شد افرادی که دچار مشکل مثانه (مثلا احتباس ادرار) شده اند به پزشک یا درمانگاه زنان مراجعه کنند.

☆ ۴۰ روز بعد از زایمان طبیعی یا سزارین چنانچه خونریزی بیش از حد قاعدگی یا دفع لخته فراوان مشاهده شد باید حتما به پزشک یا درمانگاه زنان مراجعه کنند.

### قابل توجه مادران عزیز:

کلینیک مامایی بیمارستان مادر همه روزه بجز ایام تعطیل آماده پاسخگویی به مشکلات شما عزیزان در زمینه زنان و زایمان می باشد.

- زخم را دستکاری نکنید و بدون اجازه پزشک روی آن پماد، کرم یا لوسیون نزنید
- مصرف مایعات و سبزیجات و میوه فراوان جهت پیشگیری از یبوست شدید و باز شدن بخیه ها توصیه می شود
- لباس زیر تنگ به همراه نوار بهداشتی، از رسیدن هوا به زخم جلوگیری و روند خوب شدن زخم را کند می کند.
- هرگز از تامپون استفاده نکنید. نوار یا پد بهداشتی خود را هر دو تا چهار ساعت یک بار عوض کنید

### □ مراقبت از پستان

قرار گرفتن نادرست نوک پستان در دهان نوزاد و مکیدن غلط شیرخوار باعث می شود شیر از پستانها تخلیه نشده و این امر موجب کاهش تولید شیر نیز خواهد شد. همچنین شستشوی مکرر پستان با الکل و صابون و یا استفاده از محلولها و کرمهای تحریک کننده نیز می تواند باعث بروز ترک و زخم نوک پستان می شود. در صورت وجود شقاق حتما به پزشک مراجعه شود (به دلیل احتمال ورود میکروب از شکاف) در صورت داشتن بیماری زمینه ای و مصرف دارو از لحاظ تاثیر دارو در شیر مادر حتما با پزشک مشورت انجام شود.

۱. درد پستان در ۳ تا ۵ روز اول پس از زایمان به جهت

پرشیر شدن پستان های مادر می باشد که باید از سینه

## ☐ نفاس

شش هفته اول پس از زایمان نفاس نامیده میشود در این مدت لازم است مادر چند نوبت توسط کارکنان بهداشت در مراکز بهداشت مراقبت شود .

برای جلوگیری از کم خونی و کمبود ویتامین ها مصرف روزانه یک عدد قرص آهن و یک عدد قرص مولتی ویتامین تا سه ماه پس از زایمان ضروری است .

## ☐ مشکلات گوارشی

اغلب خانم ها در روزهای اول پس از زایمان دچار یبوست می شوند که به محض شروع فعالیت های بدنی و مصرف مایعات به میزان کافی و غذاهای حاوی فیبر (میوه و سبزیجات تازه ) به رفع یبوست کمک می کند . ضمناً هیچگونه محدودیت مصرف مایعات وجود ندارد .

## ☐ درد پس از زایمان

در روزهای اول پس از زایمان درد هایی شبیه درد قاعدگی وجود دارد که پس درد نامیده می شود و این درد هنگام شیردهی بیشتر می شود .

جهت رفع این درد استفاده از مسکن ساده مثل استامینوفن و بروفن توصیه می شود . اگر این درد شدید و مداوم و همراه با تب و خونریزی فراوان باشد باید فوراً به پزشک مراجعه کرد .

## ☐ ورزش و فعالیت های بدنی

برای برگشت سریع تر ماهیچه های شکم به حالت اولیه ، انجام حرکات ورزشی زیر نظر پزشک به مادران توصیه می شود .

## ☐ علائم خطر پس از زایمان

- ۱- تب و لرز
- ۲- خونریزی بیش از میزان قاعدگی بعد از ۱۰ روز ۳- درد و ورم ناحیه بخیه ها
- ۴- قرمزی و تورم پستان
- ۵- لمس توده و یا درد و تورم و خروج ترشحات چرکی از محل بخیه ها
- ۶- درد زیر دل یا درد ساق پا
- درد و سوزش هنگام ادرار ، تکرر ادرار
- ۸- سرگیجه و رنگ پریدگی و تهوع و استفراغ شدید
- ۹- افسردگی پس از زایمان

## ☐ ۷- تنظیم خانواده

شروع استفاده از روش های جلوگیری از بارداری در مادران شیرده و غیر شیرده متفاوت است . مادرانی که شیر خود را به نوزادشان می دهند ۴۰ روز پس از زایمان و مادرانی که شیر خود را به نوزادشان نمی دهند یا شیرکمی استفاده می کنند ۲۰ روز پس از زایمان

۱. استفاده از روشهای پیشگیری را آغاز می کنند .

۲. حاملگی مجدد صرفاً نباید با خونریزی قاعدگی باشد گاهی حتی قبل از قاعدگی تخمک گذاری انجام می شود

## ☐ مراقبت از محل اپی زیاتومی (محل بخیه دستگاه

### تناسلی در زایمان طبیعی )

۱. روی بخیه های تان ننشینید .
۱. برای جلوگیری از باز شدن بخیه ها، بهتر است تا خوب شدن زخم، روی یک بالش طبی حلقوی بنشینید
۲. در صورت درد شدید و ورم ناحیه بخیه ها حتماً به پزشک اطلاع دهید و جهت مراقبت از بخیه اقدامات ذیل را انجام دهید :
- زخم را با سرم شستشو (نرمال سالین ) بشویید
- در صورت توان روزی دو بار به مدت ۵ دقیقه سشوار را روی درجه کم گذاشته واز فاصله زانوها روی محل بخیه ها گرم شود(جهت ترمیم بهتر محل بخیه ها
- پس از هر بار شستشو پرینه یا دستگاه تناسلی ، حتماً خودتان را با بادسشوار، از فاصله ۵۰ سانتی یا حوله نخی نرم، خشک کنید.