

## مراقبت از لوله های تخلیه (درن) در منزل



### واحد آموزش بیمارستان مادر

کد سند: MH\AM\PT\062

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کد بازنگری: ۰۰۳

### بیمارستان و زایشگاه تخصصی مادر

بلوار سجاد - بزرگمهر شمالی ۱

۰۵۱۳۷۰۴۸۲۲۴

### در صورت مشاهده علائم زیر فوراً گزارش دهید:

- تغییر رنگ ناگهانی درناژ
- قطع ناگهانی درناژ
- علائم و نشانه های عفونت (درناژ بدبو،
- افزایش درجه حرارت
- م شستشو دهید و به آرامی خشک کنید.

در زمان ترخیص اطمینان حاصل  
کنید که نحوه تخلیه ترشحات و  
اندازه گیری آن را فرا گرفته اید

منبع: آموزش به بیمار و خانواده، بشری، ۸۸۱۱، چاپ اول



### نکته:

- در صورت خارج شدن درن از محل خود، روی محل درن یک گاز استریل گذاشته و به پزشک مراجعه کنید.
- دقت کنید که لوله ها دچار پیچ خوردگی نشوند.
- از فشار و خم شدن لوله ها خودداری کنید.
- محفظه جهت تسهیل درناژ ترشحات پایین تر از بدن قرار گیرد.
- درن همیشه باید در حالت خلاء یا شارژ قرار گیرد.
- داروها را طبق دستور پزشک استفاده کنید.
- جهت پیگیری درمان با پزشک معالج خود ملاقات داشته باشید.
- در مورد زمان کشیدن بخیه ها و تعویض پانسمان از جراح خود سوال کنید.
- در مورد تخلیه ترشحات حتماً از پزشک سوال شود ( گاهی پزشک از بیمار می خواهد تا زمان مراجعه به مطب درن تخلیه نشود )

●- محفظه درن را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچه را ببندید. هیچ نوع مایع یا محلول ضد عفونی وارد درن نشود



مراقب باشید درن از محل خارج نگردد در آخر کلیپس را باز کنید تا مسیر درن باز شود.



درن را می توانید داخل کیسه تمیز قرارداده و با خود حمل کنید

اندازه گیری مایع حاصل از درناژ را از پرستار یاد بگیرید.

شستن دستها قبل و بعد از خالی نمودن درن ها اهمیت زیادی دارد.

- ابتدا مسیر درن را با کلیپس درن ببندید.



بالای درن دو دریچه است، دریچه ای که به شلنگ وصل نیست را باز کنید.



مایع داخل آن را درون درون ظرف سرم یا یک ظرف مدرج بریزید و میزان درجه را خوانده و بر روی کاغذ یادداشت نمایید و مایع را در توالی تخلیه کنید



پزشک جراحی در حین عمل جراحی ممکن

است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند. باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر می کند و این خونریزی ها باید در صورت وجود از بدن به وسیله این لوله ها خارج شوند.

لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل می شوند تا خون در آنها جمع آوری شود. به لوله ها که در محل جراحی گذاشته شده است "درن" می گویند. این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج می شود



**نحوه ایجاد خلاء در درن و تخلیه ترشحات درن:**

در صورتی که با درن هایی به شکل زیر مرخص شدید قبل از ترخیص، چگونگی تخلیه ترشحات و