

چرخش بیضه



واحد آموزشی بیمارستان مادر

گروه هدف: والدین و همراهیان

کد سند: MH\AM\PT\056

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

کد سند: ۰۰۵

آدرس: بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی ۱

شماره تماس: ۳۷۰۴۸۰۰۰ - ۰۵۱

بیضه های مصنوعی تنها جنبه ظاهری داشته و نمی توانند عملکرد بیضه را شبیه سازی کنند اما می توانند به لحاظ ظاهری فقدان یک بیضه را جبران کنند. البته این کار در تمام موارد چرخش بیضه انجام نمی شود و باید به درخواست خود فرد بیمار باشد، لذا در صورت تمایل، موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید.

منبع: www.nursingcosult.com

www.uptodate.com



از طریق اسکن این QR CODE و یا سایت زیر می توانید به محتوی این پمفلت و سایر مطالب آموزشی دسترسی داشته باشید.

<https://motherhospital.ir/educational-pamphlet/>

اغلب برای تشخیص چرخش بیضه، فرد مبتلا تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد و پزشک جراح برشی کوچک را در کیسه بیضه ها ایجاد کرده و رگ های خونی بیضه ها را بررسی می کند.

اگر چرخش بیضه رخ داده باشد و رگ های خونی مسدود شده باشند، پزشک جراح بلافاصله آنها را آزاد کرده و به حالت طبیعی خود باز می گرداند. در این حالت خون دوباره داخل رگ ها به جریان در خواهد آمد.

در اغلب موارد بلافاصله بعد از بازگرداندن بیضه ها به حالت طبیعی، خون در رگ های بیضه ها جریان پیدا کرده و بیضه ها از رنگ آبی تیره به صورتی تغییر پیدا می کنند. این حالت می تواند تایید برقراری مجدد جریان خون در بیضه ها باشد.

معمولا پزشک جراح، به کمک چند بخیه بر روی پوشش بیضه و عضلات از بروز مجدد این عارضه پیشگیری می کند.

اگر تشخیص و درمان برای مدت زیادی به تاخیر انداخته شود ممکن است جریان خون داخل بیضه ها به حالت طبیعی خود باز نگردد.

در برخی موارد به علت طولانی شدن توقف خونرسانی به بیضه، بیضه سیاه شده و در چنین شرایطی تنها راه حل ممکن برداشتن آن بیضه می باشد.

احتمالا قبل از برداشتن بیضه از فرد رضایتنامه کتبی گرفته خواهد شد.

ممکن است بعد از خارج کردن بیضه، برای اینکه کیسه بیضه ظاهر طبیعی خود را از دست ندهد، پزشک جراح از یک بیضه مصنوعی استفاده کند.

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماسه است. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید

تعریف:

به پیچش در طناب اسپرم ها (طنابی که بیضه ها از آن آویزان هستند) گفته می شود که در این بیماری عروق وارد بیضه شده و این مسئله باعث عدم خونرسانی به بیضه می شود. که با درد ناگهانی همراه است.

یک اورژانس پزشکی است و تا ۴-۶ ساعت سریعاً باید به مراکز درمانی مراجعه نمود در غیر این صورت منجر به آسیب بیضه و خارج سازی بیضه می شود.

عوامل:

- نبود بافتی که بیضه را به کیسه بیضه اتصال می دهد. و این اغلب در نوزادان رخ می دهد.

- طناب اسپرم بلندتومور یا توده در در بیضه
- تومور یا توده در در بیضه
- در اطفال در سنین قبل از مدرسه بیشتر رخ می دهد.

علائم:

- مهم ترین علامت درد شدید در بیضه می باشد.
- تورم، قرمزی، سفتی بیضه
- درد منتشر در شکم
- بزرگتر شدن یک بیضه نسبت به دیگری
- بیضه بزرگتر از حد نرمال
- تهوع و استفراغ

تشخیص:

- سونوگرافی
- عکس ساده
- MRI
- آزمایش ادرار

درمان:

جراحی فوری

و بستگی به شدت بیماری دارد. در صورتی که کمتر از ۴-۶ ساعت گذشته است با جراحی پیچ و تاب را باز می کنند و محل بیضه را بخیه زده تا از بازگشت مجدد بیماری جلوگیری شود و همین کار برای پیشگیری در سمت مقابل هم انجام می شود. در مواقع شدیدو طول کشیده که بیضه قابلیت حیات ندارد، بیضه را تماماً خارج می سازند.

