



آسپیریشن مکونیوم

(خوردن مدفوع توسط نوزاد)



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر
گروه هدف : مادران

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای
این پمفت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\029

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

کد بازنگری: ۰۰۶

جنین است و باید به سرعت برای سزارین اورژانس اقدام کرد،
زیرا همان دلایلی که به مدفوع کردن جنین منجر میشود،
میتواند به مرگ جنین نیز منجر گردد.

پیگیری های لازم پس از ترخیص از بیمارستان

۱- ویزیت ۴۸ ساعت پس از ترخیص

۲- دمای اتاق ۲۵ درجه باشد.

۳- در صورت افزایش تعداد تنفس و تورفتگی دندنه ها و سیاه
شدن لب ها هنگام تغذیه ، اورژانسی به پزشک مراجعه شود .

۴- در موارد شدید آسپیریشن مکونیوم ، کودک از نظر تأخیر
رشدی مورد بررسی قرار گیرد.



منبع: نوزادان نلسون- وونگ

ارتباط با ما:

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی یک

پس از درمان اضطراری ، نوزاد برای ادامه درمان در بخش
مراقبت ویژه نوزادان بستری و درمان های زیر انجام می شود:

(۱) تهویه مکانیکی: استفاده از دستگاه کمکی تنفسی
(ونتیلاتور) جهت حفظ حجم ریه

(۲) درمان با تجویز سورفاکтан: تجویز مایع سورفاکتان
مصنوعی به داخل ریه های نوزاد که باعث باز نگه داشتن کیسه
های هوایی می شود.

(۳) آنتی بیوتیک و مایع درمانی

(۴) اکسیژن درمانی (کلاهک): برای برقراری اکسیژن کافی در
خون

(۵) گرم نگه داشتن نوزاد و ساکشن ترشحات دهان نوزاد

پیش آگهی

(۱) نوزادان با آسپیراسیون مکونیوم خفیف خوب هستند. مگر این
که عوارضی نظیر افزایش فشار ریه با کمبود اکسیژن شدید
در طول بیماری به وجود آمده باشد.

(۲) در موارد شدید، عوارض عصبی رایج هستند. با وجود حمایت
های فراوان ، مرگ ممکن است اتفاق بیفتد.

تمامی جنین ها وقتی کاملاً بالغ و رسیده می شوند، میتوانند
مدفوع کنندواین روند بویژه در جنین هایی که از تاریخ زایمان
طبیعی شان گذشته است در حالی که هنوز دردهای زایمانی
شروع نشده، رخ می دهد. وقتی به طور طبیعی جنین، مددخواه
می کند معمولاً خطری جنین را تهدید نمی کند و فقط در مواردی
که جنین به این دلیل مددخواه می کند که تحت استرس ناشی از
کمبود اکسیژن است ، مددخواه کردن جنین علامت در خطر بودن

فشننه ها :

پیش از تولد، دربررسی جنینی ممکن است کاهش تعداد ضربان قلب آشکارشود. در زمان تولد، لکه های تیره رنگ در مایع آمنیون دیده میشود و نوزاد ممکن است نمره آپگار پایین داشته باشد.

روش های تشخیص :

- * گرافی قفسه سینه
- * آزمایش گاز های خون
- * مشاهده دهان و بینی (وجود لکه های مکونیوم در آن)

عوارض :

- الف) تجمع هوا داخل ریه
- ب) عفونت ریه
- ج) افزایش فشار ریه
- د) اسیدی شدن خون
- ه) کاهش قندخون
- و) کاهش کلسيم

درمان و پیشگیری :

الف) دراتاق زایمان

در صورتی که جنین تعداد ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ بارد در دقیقه را دارد، بلا فاصله زایمان انجام می شود ولوله تنفسی با استفاده از آسپیراتور مخصوص مکونیوم ساکشن میشود و دهان و حلق تمیز میشود و جریان آزاد اکسیژن تجویز میشود.

فاکتورهای خطر:

دیابت مادری، فشار خون مادری، زایمان سخت، بیماری قلبی مزمن مادر، جداسدن زودرس جفت

علائم بالینی / تشخیصی :

- ۱) تنفس مشکل
- ۲) شل بودن نوزاد زمان تولد، کاهش رفلکس های نوزادی
- ۳) تنفس سریع
- ۴) عدم تنفس
- ۵) کبدشدن نوزاد
- ۶) چروک خوردن پوست اطراف زانوها، زیریغله و باسن
- ۷) بسترناخن و پوست اغلب به رنگ زرد- سبز درآید.
- ۸) قفسه سینه، بشکه ای (برآمده) به نظر می رسد.
- ۹) کاهش ضربان قلب در هنگام تولد

بارداری که بیش از ۴۰ هفته طول بکشد، منجر به پیری جفت میشود. جفت ارگانی است که مواد غذایی را در رحم به جنین می رساند. وقتی جفت، پیر میشود قادر به تامین اکسیژن کافی برای جنین نیست، از طرفی مقدار مایع آمنیوتیک به دلیل دفع مکونیوم کاهش می یابد، درنتیجه آسپیراسیون مکونیوم، جنین دچار نارسایی تنفسی می شود، به همین دلیل سندروم آسپیراسیون مکونیوم در میان نوزادانی که با زایمان زودرس متولد شده اند، کمتر دیده می شود.

بارداری، اضطراب و تنفس های خاص خودش را دارد و باید در این دوران از هر گونه عوامل استرس زا دوری نمود که روحی جنین تاثیر نگذارد.

سندروم آسپیراسیون مکونیوم

تعریف : به نوزادی اطلاق می شود که قبل از تولد یا هنگام تولد به دلایلی، مدفوع خود را که به آن مکونیوم می گویند خورده و وارد ریه نوزاد شده باشد.

مکونیوم یا همان مدفوع جنینی در هنگام بارداری در هفته ۱۰-۱۶ بارداری در روده جنین تولید شده و به طور طبیعی تا بدو تولد دفع نمی شود.

مکونیوم اولین مدفوع نوزاد است که به شکل چسبنده و سبز رنگ بوده که توانایی چسبیدن به بافت ریه را داشته و وقتی جنین به علت کمبود اکسیژن تحت استرس و فشار است حرکات روده جنین تحریک شده و در یچه مقعد شل می شود و مکونیوم به فضای مایع آمنیون ریخته می شود.

در بارداری، جنین در مایع آمنیون داخل رحم شناور است. آسپیراسیون مکونیوم وقتی اتفاق می افتد که جنین در داخل رحم یا نوزاد با اولین تنفس پس از تولد، مکونیوم و مایع آمنیون را به داخل ریه ببرد.

علت :

زمانی که جنین هنگام تولد تحت فشار قرار می گیرد آسپیراسیون روی می دهد. این بیماری در نوزادان رسیده یا دیررس شایع می باشد و به ندرت در نوزادان متولد شده در زیر ۳۶ هفته مشاهده می شود.

مایع آمنیوتیک

