


آپاندیسیت در اطفال



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر
گروه هدف: بیماران و همراهیان

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش در مورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MHVAMPT.044

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۰۳/۳۰

کد سند: ۰۰۶

در صورت بروز علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه نمایید:

-کودک زیر ۳ ماه با تب بالای ۳۸ درجه

-استفراغی که متوقف نشود.

با آرزوی سلامتی برای شما
منبع: medlinepluse

ارتباط با ما:

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی
پک

در صورت وجود شرایط زیر معمولاً جراحی فوری انجام نمی شود.

-اختلالات انعقادی و خونریزی

-داشتن شرایطی مثل عفونت و پارگی آپاندیس

-در زنان بارداری که نزدیک زایمان هستند.

مراقبت ها:

از دادن آسپرین به هنگام درد خودداری نمایید.

آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشک را به صورت دوره کامل مصرف کنید.

در مورد محدودیت غذایی از پرستار خود سوال بپرسید.

پس از بهبودی فعالیت به حالت قبل برمی گردد.



والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید.

آپاندیسیت:

آپاندیسیت به التهاب آپاندیس گفته می شود. آپاندیس یک زائده انگشت مانند است که به روده بزرگ متصل است. پاره شدن آپاندیس خطرناک است و باعث عفونت شکم می شود.

عوامل زمینه ساز:


- تجمع مدفوع در روده بزرگ
- بزرگی غدد لنفاوی به دلیل تحریک سیستم ایمنی
- ضربه
- گاهی اوقات عوامل شناخته شده نیست.

افزایش بروز ابتلا:

بیشتر در سنین ۱۰ تا ۳۰ سال بروز می یابد.

علائم:

- درد دور ناف و قسمت تحتانی راست شکم
- با سرفه و حرکات بدتر می شود.
- درد شدید در اثر لمس در ناحیه راست و تحتانی شکم
- تهوع و استفراغ
- کاهش اشتها
- تب
- یبوست
- اسهال
- بی قراری



تشخیص:

- معاینه
- آزمایش خون
- آزمایش ادرار
- سونوگرافی
- سی تی اسکن
- MRI

درمان:

- جراحی و خارج کردن آپاندیس به دو صورت
- جراحی باز شکمی و جراحی لاپاروسکوپیک:
- از طریق دوربین و چند سوراخ روی شکم انجام می شود.
- در التهاب کم حتی ممکن است نیاز به جراحی نباشد.
- آنتی بیوتیک و مایعات وریدی نیز تجویز می گردد.