

ختنه



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر گروه هدف : مراجعین و بیماران

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش درمورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\055

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۱۱/۱۹

کد سند: ۰۰۷

زمان انجام:

معمولا بهتر است در ابتدای تولد قبل از ترخیص از بیمارستان انجام شود .

اما برخی از والدین تحمل این عمل برای نوزاد را ندارند و تصمیم می گیرند به تعویق بیندازند این مورد بستگی به فرهنگ و تصمیم آن ها دارد.

قبل از سه ماهگی معمولا با بی حسی موضعی اما بعد از آن با بییهوشی عمومی انجام می شود.

با آرزوی سلامتی برای شما

منبع: medlinepluse

ارتباط با ما :

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی يك

جهت کاهش درد عوامل زیر موثرند:

- حضور پدر مادر و آرام کردن کودک
- محلول های قندی
- دادن استامینوفن

پزشک قبل از انجام ختنه باید توضیحات کامل را در اختیار پدر و مادر بگذارد.

چندین عامل باعث به تاخیر انداختن ختنه می شود شامل:

- نوزاد نارس
- نقص در سیستم تناسلی و نیاز به مشورت با جراح یا اورولوژیست کودکان
- سابقه خانوادگی اختلالات خونریزی دهنده

مراقبت های بعد از عمل:

- ۱- پانسمان ناحیه تا ۳-۵ روز باقی بماند زیرا باعث می شود که زخم با پوشک در تماس نباشد و تمیز بماند.
- ۲- ترشح زرد رنگی چند روز روی ناحیه برش ممکن است دیده شود .
- ۳- در صورت خونریزی، تورم، قرمزی وسیع باید به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- ۴- بعد از ختنه نیاز به هیچ گونه درمان اضافی و پماد های مختلف نیست .

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید.

ختنه

ختنه در پسران یعنی برداشتن پوست کلاhek آلت تناسلی و از دوران قدیم رایج شده است. ابتدا در مصر باستان انجام می شد. و بعد ها در بین مسلمانان و یهودیان

ختنه به دو صورت عمل جراحی و سرپایی انجام می شود. اطلاعات دقیقی از این کدام بیشتر انجام می شود یا کدام نوع بهتر است وجود ندارد.

در هنگام تولد این پوست اضافه یک قسمت جدا که چسبیده روی آلت می باشد که جدا شدگی کامل این قسمت در سنین مختلف ایجاد می شود. که در پسرانی که ختنه نشده اند فضایی را جهت تجمع آلودگی ایجاد می کند.

برخی از والدین ممکن است از ختنه کردن کودکان ترس داشته باشند. در این صورت باید تا زمان ختنه بهداشت آن ناحیه رعایت شود.

اثرات سودمند ختنه:

- ۱- کاهش عفونت مجرای اداری
 - ۲- کاهش بروز سرطان
 - ۳- کمتر شدن بروز التهاب و سایر مشکلات در ناحیه تناسلی
 - ۴- بهداشت مناسب ناحیه تناسلی
- اما برای موارد فوق فقط ختنه کردن کافی نیست و الزاما ختنه باعث بهبود تمام موارد نمی شود.



اثرات نامطلوب در صورت انجام ختنه توسط افراد

ناوارد:

- برداشتن میزان ناکافی پوست که منجر به ظاهر نامناسب می شود.
- خونریزی
- عفونت در صورت خفیف بودن با آنتی بیوتیک درمان می شود.
- منجر به بریدن قسمت پنیس (آلت) می شود.
- منجر به ایجاد چسبندگی یا کیست می شود.
- یا اثر زخم روی آلت باقی می ماند.
- در صورت جراحی عوارض بیهوشی نیز محتمل است. مطالعاتی نشان می دهد که نوزادان در طول ختنه چه علائمی مبنی بر درد را دارند.
- گریه، افزایش ضربان قلب و کاهش فشار خون از این علائم هستند.

