




بیمارستان و دانشکده مادر
Mother Hospital

انواژیناسیون (درهم فرورفتگی روده ها)



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر

گروه هدف : بیماران و همراهیان

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش در مورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\042

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۰۳/۳۰

کد سند: ۰۰۶

توصیه های پس از ترخیص:

دو روز بعد از عمل جراحی می توانید کودک خود به حمام ببرید.

از کادر درمان جهت سطح فعالیت فرزندتان پس از ترخیص سوال کنید.

به علائم بازگشت انواژیناسیون (درهم فرورفتگی در روده) توجه داشته باشید.

با آرزوی سلامتی برای شما

منبع: medlinepluse

ارتباط با ما :

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰

آدرس: مشهد، بلوارسجاد، خیابان بزرگمهر شمالی یک

درمان:

هدف اصلی درمان جلوگیری از پاره شدن و عفونت کامل شکم می باشد.

درمان در بیمارستان انجام می شود و شامل:

- برقراری رگ محیطی
- انجام بارییم انما جهت شست و شوی روده ها و انجام عکس و سونوگرافی

- **انجام بارییم هوا** : یعنی فرستادن هوا با فشار به درون روده جهت باز شدن درهم رفتگی روده ها

- ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد در صورتی که عفونت شکم داشته باشد یا درمان انما کارساز نباشد، قسمتی از روده از بین رفته باشد و نیاز به خارج سازی آن باشد یا انواژیناسیون (درهم فرورفتگی در روده) بعد از انما نیز دوباره ایجاد شود.

کودک بعد از درمان باید چند روز در بیمارستان بماند تا از بازگشت نکردن آن اطمینان پیدا کنیم و حرکات روده و رژیم غذایی نرمال داشته باشد.

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماسه است. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید

انواژیناسیون (درهم فرورفتگی در روده)

تعریف:

انواژیناسیون یک درهم فرورفتگی در روده می باشد. زمانی که یک قسمت از روده وارد بخش دیگر آن می شود.

علائم: درد شدید شکمی

- شکم بزرگ شده وسفت
- استفراغ
- بی قراری یا خواب آلودگی
- مدفوع خونی
- تب و گریه



۱

• شیر نخوردن

• زانوهای خود را به قفسه سینه فشار می آورد.

• پوست رنگ پریده

• تعریق

عوامل افزایش ریسک ابتلا:

• پسر بچه ها

• کودکان کمتر از ۳ سال


• کودکان با عفونت های ویروسی

• کودکانی با تومور یا کیست یا پولیپ ،رگه های خونی

بدشکل

• کودکانی که اخیرا عمل جراحی شکم انجام دادند.

• ممکن است بعد از دریافت واکسن روتا ویروس هم دیده شود.



۲

عوامل:

در بیشتر مواقع دلیل آن التهاب و تورم غدد لنفی است . اما گاهی ممکن است آپاندیس یا تومور های روده باعث ایجاد آن شوند.

انواژیناسیون عمده ترین علت انسداد روده در کودکان ۳ ماهه تا ۳ ساله می باشد. اما بیشتر در ۱ سالگی رخ می دهد. میزان بروز آن در پسرها بیشتر از دخترها می باشد.هم در کودکان و هم در بزرگسالان رخ می دهد.

تشخیص:

براساس علائم کودک و معاینه و همچنین استفاده از سونوگرافی یا عکس شکم



۳