



بیمارستان و زایشگاه مادر
Mother Hospital

فتق کشاله ران در اطفال

Inguinal Hernia



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر گروه هدف : بیماران و همراهیان

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش درمورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\051

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۰۳/۳۰

کد سند: ۰۰۶

بعد از کشیدن بخیه ها می توانید محل زخم را با آب و صابون ملایم شستشو دهید و به آرامی خشک کنید.

آغوش گرفتن کودک پس از جراحی طوری که ناحیه عمل تحت فشار نباشد، مانعی ندارد.

در بیماران پسر بعد از عمل ناحیه بیضه ها کمی متورم می شود که طبیعی است.

از انجام بازی های سنگین مانند پریدن، دویدن، شنا کردن توسط کودک اجتناب شود.

با آرزوی سلامتی برای شما
منبع: medlinepluse

ارتباط با ما :

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰

آدرس: مشهد، بلوارسجاد، خیابان بزرگمهر شمالی يك

مراقبت های بعد از عمل:

۲-۳ روز بعد عمل، محل جراحی با پانسمان پوشیده باشد.

مراقب باشد که پوشک کودک با ناحیه عمل تماس نداشته باشد

در صورتی که کودک درد داشته باشد می توان از داروهای تجویز شده (شیاف استامینوفن) استفاده نمود .

یا از کمپرس سرد (یخ پیچیده شده داخل پارچه) به مدت ۲۰ دقیقه استفاده کرد.

تا زمان کشیدن یا جذب شدن بخیه ها، خروج مقدار کمی خون یا ترشح از محل بخیه ها طبیعی می باشد.

۷-۱۰ روز بعد از عمل لازم است برای کشیدن بخیه ها به درمانگاه مراجعه کنید.

در صورت تجویز داروی آنتی بیوتیک آن را در زمان مشخص و به طور کامل مصرف کنید.

والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماسست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید.

فتق کشاله ران در اطفال

فتق زمانی اتفاق می افتد که لایه های درونی عضله شکمی ضعیف شده و اعضاء شکمی به این دیواره ضعیف شده فشار آورده و یک کیسه بادکنک مانند درست می کند

عوامل افزایش ابتلا فتق ران و کشاله ران:

پسرپچه ها

نوزادان نارس

کودکان نژاد آفریقایی و آمریکایی

کودکان با بیماری سیستیک فیبروزیس (بیماری ارثی در مخاط که باعث می شود ترشحات بدن غلیظ و چسبنده باشد).

علائم:

در علائم باید به اینکه آیا با گریه یا سرفه فتق بزرگتر می شود یا نه و اینکه حرکات روده ای دارد توجه شود.

در صورتی که برآمدگی در بیضه ها یا ناحیه اتصال ران به شکم باشد فتق کشاله ران و اگر روی عضله ران باشد فتق رانی می باشد.

هرنی با فشار به عقب بر می گردد و با درد همراه است ممکن است تهوع و استفراغ نیز داشته باشد.



تشخیص:

با معاینه فیزیکی امکان پذیر است.

درمان:

اغلب جراحی می باشد.

مراقبت در منزل:

به هیچ عنوان فتق را به داخل فشار ندهید.

در صورت تغییر رنگ یا سایز یا درد ناحیه به پزشک اطلاع دهید.

در صورت علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه نمایید:

سرفه خلط دار و مکرر

بی قراری

نخوردن غذا

تب

درد در ناحیه

استفراغ

بیرون زدگی فتق با سرفه و گریه

در مواقع اورژانس با ۱۱۵ تماس بگیرید.