

## چرخش بیضه



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر  
گروه هدف: بیماران و همراهیان

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش در مورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\056

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۰۳/۳۰

کد سند: ۰۰۶

بیضه های مصنوعی تنها جنبه ظاهری داشته و نمی توانند عملکرد بیضه را شبیه سازی کنند اما می توانند به لحاظ ظاهری فقدان یک بیضه را جبران کنند. البته این کار در تمام موارد چرخش بیضه انجام نمی شود و باید به درخواست خود فرد بیمار باشد، لذا در صورت تمایل، موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید.

با آرزوی سلامتی برای شما  
منبع: medlinepluse

ارتباط با ما:

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی یک

اغلب برای تشخیص چرخش بیضه، فرد مبتلا تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد و پزشک جراح برشی کوچک را در کیسه بیضه ها ایجاد کرده و رگ های خونی بیضه ها را بررسی می کند.

اگر چرخش بیضه رخ داده باشد و رگ های خونی مسدود شده باشند، پزشک جراح بلافاصله آنها را آزاد کرده و به حالت طبیعی خود باز می گرداند. در این حالت خون دوباره داخل رگ ها به جریان در خواهد آمد.

در اغلب موارد بلافاصله بعد از بازگرداندن بیضه ها به حالت طبیعی، خون در رگ های بیضه ها جریان پیدا کرده و بیضه ها از رنگ آبی تیره به صورتی تغییر پیدا می کنند. این حالت می تواند تایید برقراری مجدد جریان خون در بیضه ها باشد.

معمولاً پزشک جراح، به کمک چند بخیه بر روی پوشش بیضه و عضلات از بروز مجدد این عارضه پیشگیری می کند.

اگر تشخیص و درمان برای مدت زیادی به تاخیر انداخته شود ممکن است جریان خون داخل بیضه ها به حالت طبیعی خود باز نگردد.

در برخی موارد به علت طولانی شدن توقف خونرسانی به بیضه، بیضه سیاه شده و در چنین شرایطی تنها راه حل ممکن برداشتن آن بیضه می باشد.

احتمالاً قبل از برداشتن بیضه از فرد رضایتنامه کتبی گرفته خواهد شد. ممکن است بعد از خارج کردن بیضه، برای اینکه کیسه بیضه ظاهر طبیعی خود را از دست ندهد، پزشک جراح از یک بیضه مصنوعی استفاده کند.

## والدین گرامی:

محتوی آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماسست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید

## چرخش بیضه

به پیچش در طناب اسپرم ها (طنابی که بیضه ها از آن آویزان هستند) گفته می شود که در این بیماری عروق وارد بیضه شده و این مسئله باعث عدم خونرسانی به بیضه می شود. که با درد ناگهانی همراه است.

یک اورژانس پزشکی است و تا ۴-۶ ساعت سریعاً باید به مراکز درمانی مراجعه نمود در غیر این صورت منجر به آسیب بیضه و خارج سازی بیضه می شود.

## عوامل:

نبود بافتی که بیضه را به کیسه بیضه اتصال می دهد. و این اغلب در نوزاد رخ می دهد.

طناب اسپرم بلندتومور یا توده در بیضه

در اطفال در سنین قبل از مدرسه بیشتر رخ می دهد.

## علائم:

مهم ترین علامت درد شدید در بیضه می باشد.

تورم، قرمزی، سفتی بیضه

درد منتشر در شکم

بزرگتر شدن یک بیضه نسبت به دیگری

بیضه بزرگتر از حد نرمال

تهوع و استفراغ

## تشخیص:

سونوگرافی

عکس ساده

MRI

آزمایش ادرار

## درمان:

جراحی فوری

و بستگی به شدت بیماری دارد.

در صورتی که کمتر از ۴-۶ ساعت گذشته است با جراحی پیچ و تاب را باز می کنند و محل بیضه را بخیه زده تا از بازگشت مجدد بیماری جلوگیری شود و همین کار برای پیشگیری در سمت مقابل هم انجام می شود.

در مواقع شدید و طول کشیده که بیضه قابلیت حیات ندارد، بیضه را تماماً خارج می سازند.

