


حاملگی خارج رحمی



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر

گروه هدف: بیماران و همراهیان

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش درمورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\155

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۰۳/۱۷

کد بازنگری: ۰۰۰

درمان

- دارویی: استفاده از متوترکسات در موارد خاص
- جراحی: لاپاراسکوپي یا لاپاراتومی برای برداشتن بافت حاملگی
- مراقبت و پیگیری منظم پس از درمان

نکات مهم برای پیشگیری و پیگیری

- درمان به موقع عفونت های لگنی
- پرهیز از سیگار
- مراجعه زودهنگام به پزشک در بارداری برای اطمینان از محل بارداری



منبع: WWW.Med Line Plus

ارتباط با ما:

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی یک

حاملگی خارج رحمی چیست؟

وقتی تخمک بارور شده به جای اینکه داخل رحم لانه گزینی کند، در لوله فالوپ (رحمی) یا جای دیگری تخمدان، دهانه رحم یا حفره شکمی قرار بگیرد حاملگی خارج رحمی ایجاد می شود.

این وضعیت خطرناک است و نیاز به تشخیص و درمان سریع دارد.

علائم هشدار

- درد یک طرفه در پایین شکم یا لگن
- خونریزی واژینال غیر عادی کم یا زیاد
- احساس ضعف، سرگیجه یا غش
- درد شانه به دلیل خونریزی داخلی
- تهوع یا استفراغ همراه با درد شکمی

اگر هر یک از این علائم را داشتید، فوراً به


اورژانس مراجعه نمایید.

- احساس ضعف سرگیجه یا غش
- درد شانه به دلیل خونریزی داخلی
- تهوع یا استفراغ همراه با درد شکمی
- اگر هر یک از این علائم را داشتید، فوراً به اورژانس مراجعه کنید.



عوامل خطر

- سابقه حاملگی خارج رحمی قبلی
- عفونت لگنی (PID)
- جراحی لوله فالوپ یا شکم
- استفاده از IUD
- ناباروری و درمانهای کمک باروری (IVF)
- سیگار کشیدن



روش تشخیص

- آزمایش خون اندازه گیری HCG
- سونوگرافی واژینال
- بررسی علائم بالینی توسط پزشک