

عفونت ادراری نوزادان



واحد آموزش سلامت بیمارستان مادر گروه هدف : مادران

کلینیک های فعال در بیمارستان و زایشگاه مادر				
نام کلینیک	مکان کلینیک	ساعت فعالیت	داخلی	خدمات ارائه شده
شیرمادر	طبقه همکف	۸-۱۲	۱۱۰	رفع مشکلات شیردهی مادران پس از ترخیص
آموزش سلامت همگانی		۸-۱۲	۱۲۶	ارائه آموزش در مورد دیابت و فشارخون و گرفتن فشار و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان

از طریق اسکن QR-Code می توانید به محتوای این پمفلت دسترسی داشته باشید



کد سند: MH\AM\PT\035

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۱۱/۱۳

کد بازنگری: ۰۰۸

توجهات خاص مادر

تقلا و بیقراری نوزاد پیش از ادرار کردن ملاکی از عفونت ادراری است. مادران عزیز باید به رنگ ادرار توجه نموده و برای پیشگیری رعایت بهداشت دست مهم بوده و پوشک نوزاد زود به زود تعویض شود. چون محیط مرطوب زمینه رشد میکروب ها را فراهم می کند و لباس هایی که به ناحیه تناسلی نوزاد فشار می آورد استفاده نکنید.

اگر نوزاد تب بیشتر از ۳۸ درجه داشت به مراکز درمانی مراجعه کنید و برای کاهش تب از دارویی استفاده نکنید. چون بی توجهی به درمان عفونت ادراری باعث آسیب دائمی به کلیه ها می شود.

منبع: نوزادان نلسون- وونگ

ارتباط با ما :

تلفن: ۳۷۰۴۸۱۰۰

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی يك

درمان :

نوع درمان و طول درمان را پزشک براساس تشخیص عفونت ادراری مشخص می کند و ممکن است نیاز به چند روز بستری در بیمارستان جهت تکمیل اقدامات درمانی و تشخیص باشد. معمولا نوزادان نیاز به ۱۰-۱۴ روز درمان با آنتی بیوتیک دارند. ضروری است که کشت ادرار ۴ تا ۷ روز پس از قطع درمان تکرار شود



عفونت ادراری در نوزادان:

معمولا علت عفونت ادراری در نوزادان و کودکان میکروب ها هستند که به علت نزدیک بودن مقعد به مجاری ادرار ایجاد می شوند. در دوران نوزادی راه ورودی میکروب به دستگاه ادراری بیشتر از طریق خون است. عفونت ادراری یک بیماری مهم و شایع است که میبایست به موقع تشخیص داده شود و به طور قاطع درمان شود و پیگیری های لازم جهت درمان انجام شود. در دوران نوزادی عفونت ادراری در جنس پسر رایج تر است.

علائم عفونت ادراری در نوزادان:

بی قراری نوزاد هنگام ادرار کردن

اتساع شکم و درد شکم

اسهال و استفراغ

ادرار بد بو به دلیل وجود چرک و باکتری

تغییر رنگ ادرار به رنگ سبز یا قرمز

*عفونت ادراری در نوزادان نارس شایع تر است و علائم آن شامل :

آپنه (قطع تنفس)، لتارژی (خواب الودگی)، بیحالی، کاهش ضربان قلب، افزایش تنفس، شلی بدن و نخوردن شیر

عوامل مستعدکننده در ابتلا به عفونت ادراری

۱. کوتاهی مجاری ادرار و نزدیک بودن مقعد به

مجاری ادرار

۲. عدم رعایت مسایل بهداشتی

۳. مشکلات مغزی عصبی (هیدروسفالی-اسیب

نخاعی)

۴. سابقه خانوادگی

۵. شیردهی نامناسب

۶. ختنه نشدن پسرها

۷. عفونت های انگلی



تشخیصی

آزمایش کامل و کشت ادرار

سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار در صورت

صلاحدید پزشک

نحوه جمع آوری ادرار

نحوه جمع آوری ادرار باید تمیز و با رعایت نکات

بهداشتی انجام شود. نمونه گیری از نوزاد با کیسه

ادرار بوده و قبل از نمونه گیری ادرار ابتدا بهداشت

دست انجام و نوزاد زیر سینه مادر تغذیه و سپس

محل خروج ادرار شسته (بدون صابون) و خشک

می شود سپس کیسه ادرار چسبانده می شود پس

از نیم ساعت کیسه برداشته می شود.

نمونه ادرار موجود در کیسه ادرار طی نیم ساعت به

آزمایشگاه رسانده شود و در صورت عدم امکان در

یخچال نگهداری شود تا باعث رشد میکروبی

نشود. حداقل حجم نمونه ادرار باید پنج میلی لیتر

باشد.